

## サツマイモ基腐病の防除対策

### 【植付前の準備のポイント】 苗の消毒！ 圃場の排水対策！

植付前に苗は必ず消毒しましょう（基腐病を持ち込まない対策）

※いも苗に、基腐病や他の病害の症状がないか、採苗前に必ず確認！

↓  
基腐病の発生が疑われる場合は、速やかに普及センターへ連絡してください。

- 採苗時のハサミはこまめに丁寧な水洗とふき取りを行う。
- 苗は地際から5 cm 以上離れた位置で切る。
- 採苗した苗は、採苗後、速やかに苗消毒する。
- 苗消毒用の薬液は使用当日に調製し、登録の内容に従って浸漬処理を行う。
- 切苗を購入する時は、基腐病対策が徹底されていることを販売店に確認し、未消毒の場合は購入後に必ず苗消毒を行う。

排水対策を行い、圃場に水が溜まらないようにしましょう（基腐病を増やさない対策）

- 排水しやすい向きに畦を立てる。
- 枕畦は圃場表面の排水を妨げるため、圃場に水が溜まってしまう。  
→（対策）枕畦を作らない。  
作る場合は、枕畦の途中を区切って排水溝を作る（図点線）。
- 植付前に、排水路に土砂等が詰まっていないか確認する。

